

Openingsuren secretariaat stomatologie en maxillofaciale chirurgie

Maandag	08.30 - 12.30 uur 13.00 - 17.30 uur
Dinsdag	08.30 - 12.30 uur 13.00 - 17.00 uur
Woensdag	08.30 - 12.30 uur 13.00 - 17.30 uur
Donderdag	08.30 - 12.30 uur 13.00 - 17.00 uur
Vrijdag	08.30 - 13.00 uur

Dr. K. Borghgraef

Dr. B. De Cuyper

Dr. Y. Opdenakker



MEER INFO?

Het is mogelijk dat je na het lezen van deze folder nog vragen hebt. Aarzel dan niet om onze dienst te contacteren:

09 246 81 00

AZ Maria Middelaes heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. Deze folder is indicatief en vervangt een raadpleging bij je arts niet. Mocht deze brochure vergissingen of onvolledigheden bevatten, dan zijn AZ Maria Middelaes, zijn medewerkers en zijn artsen hiervoor niet aansprakelijk.



Buitenring Sint-Denijs 30 | 9000 Gent
09 246 46 46 | www.mariamiddelaes.be | info@azmmsj.be

SAP 20126 | september 2020

Volg ons ook op:     

Implantologie zorg na de ingreep



PATIËNTENINFORMATIE



GezondheidsZorg met een Ziel

Beste patiënt

Na het plaatsen van een implantaat is het mogelijk dat je last hebt van enkele ongemakken, zeker als er ook botopbouw uitgevoerd werd. In deze folder vind je een overzicht van de meest voorkomende ongemakken en ook enkele tips.



Zwelling

Er kan zwelling optreden in de eerste 48 uur na de ingreep (vaak tijdens de laatste 24 uur meest). Nadien moet de zwelling geleidelijk afnemen. Als de zwelling toch nog toeneemt na 48 uur, neem dan contact op met je arts.

Om zo weinig mogelijk zwelling te hebben, zijn ijszakjes de eerste twee dagen aangewezen.

In het geval van botopbouw zal de zwelling meer uitgesproken zijn dan bij het plaatsen van een implantaat in goed eigen bot.

Pijn

Pijn na de ingreep zal zeer wisselend optreden. Je krijgt pijnstillers van je arts.

Bij de meeste behandelingen mag je een implantaat na een week niet meer voelen zitten. Als dit wel zo is, contacteer je best je arts. Bij botopbouwtechnieken kan je de pijn 10 tot 14 dagen voelen.

Voeding

Als de verdoving uitgewerkt is, mag je bij voorkeur zachte en lauwe voeding eten. Zo beperk je zwelling en pijn. Je mag het implantaat niet belasten tijdens de kritische 'ingroeifase' die een drietal weken duurt.

Hechting

De wonde die door de ingreep ontstaat, zal meestal gehecht worden met resorbeerbare (verteerbare) draad. Normaal verdwijnen de hechtingen spontaan. Na een tiental dagen mogen ze ook verwijderd worden.

Slapen

Bij botopbouwtechnieken raden we een halfzittende slaaphouding aan. Zo zal je minder last hebben van zwellingen.

Sport

Bij de meeste implantaatbehandelingen is het aangewezen om een week niet te sporten. Voor botopbouwtechnieken kan dit tot twee weken na de ingreep duren.

Tanden poetsen

Je mag je tanden poetsen, behalve op de plaats van de ingreep gedurende de eerste dagen. Na een week mag je de healing cap mee poetsen.

Roken / Alcohol

Roken is slecht voor de implantaten, zowel tijdens de ingroeifase als op lange termijn. De doorbloeding van het kaakbot wordt door roken immers beperkt en dat heeft invloed op de botgenezing.

