

Nazorg

Je ervaart normaal gezien weinig tot geen pijn na de operatie. Indien dat wel het geval is, kan je paracetamol innemen.

Licht tot matig bloedverlies is normaal na de ingreep. Indien het bloeden heviger wordt, neem je contact op met de dienst gynaecologie (zie verder).

Tijdens de eerste drie weken na de ingreep raden we het gebruik van tampons, seksueel contact en zwemmen af.

Na drie tot zes maanden na de operatie volgt een eerste controle waarbij opnieuw een uitstrijkje wordt genomen. Bij negen op de tien vrouwen geeft het uitstrijkje opnieuw een normaal resultaat.

Nadien blijft verdere opvolging noodzakelijk.



VRAGEN?

Als je na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kan je contact opnemen met de gynaecologen via het secretariaat gynaecologie: 09 387 70 38.



Schutterijstraat 34, 9800 Deinze
09 387 71 11 | info@azstvdainze.be
www.azstvdainze.be

6052 3635 - juli 2023

Volg ons ook op:    

LLETZ

Verwijderen van een (afwijkend) stukje van de baarmoederhals



met zorg omringd

LLETZ

LLETZ (Large Loop Excision of the Transformation Zone) is een ingreep waarbij de gynaecoloog een afwijkend stukje van de baarmoederhals verwijdert.

We noemen dit stukje weefsel afwijkend omdat het, indien onbehandeld, op lange termijn kan leiden tot baarmoederhalskanker. Deze afwijking werd vastgesteld na een afwijkend uitstrijkje of een positieve cervixbiopsie (onderzoek van een stuk weefsel van de baarmoedermond).



De dag van de operatie

Je moet nuchter zijn op de dag van je opname. Dat betekent dat je niet mag eten of drinken tot zes uur voor je operatie.

Je meldt je aan op het afgesproken tijdstip aan de onthaalbalie van het dagziekenhuis (via Meulenstraat). Daarna volg je route 23 naar het chirurgisch dagziekenhuis (op de eerste verdieping). Een verpleegkundige verwelkomt je op de afdeling, begeleidt jou naar je kamer en stelt je enkele vragen. Je hartslag en bloeddruk worden gecontroleerd.

De operatie

De ingreep vindt plaats op het operatiekwartier en gebeurt onder een korte, volledige verdoving. De operatie duurt ongeveer 15 minuten.

In de operatiezaal neem je plaats op de operatietafel en plaats je je benen in de daarvoor voorziene steunen. De gynaecoloog brengt een speculum (eendenbek) in de schede zodat je baarmoederhals goed zichtbaar wordt. Met een lusvormig schroeidraadje verwijdert de gynaecoloog een stukje van de baarmoederhalsoppervlakte.

Vervolgens wordt het wondje met een elektrische bolelektrode aangestipt om de bloeding te stelpen.

Na de ingreep

Na de ingreep word je naar de ontwaakzaal gebracht. Zodra je bij bewustzijn bent, brengt een verpleegkundige je terug naar je kamer op het chirurgisch dagziekenhuis.

Wanneer je je goed voelt en weinig bloedverlies vertoont, mag je het ziekenhuis diezelfde dag nog verlaten.

