



# **Blaasinstillatie met Farmorubicine® Postoperatief**



AZ Sint-  
Vincentius  
**DEINZE**




Je wordt opgenomen voor een trans urethrale resectie van de blaas (TUR-blaas). Na deze ingreep zal men een éénmalige blaasinstillatie (een soort blaasspoeling) uitvoeren. Je krijgt dan celdodende medicatie (cytostatica) toegediend in je blaas.

Tijdens je gesprek met de uroloog krijg je de datum van je ingreep en behandeling mee. Indien je dit wenst, kan je voordien reeds een gesprek hebben met de oncologische verpleegkundige, zodat het verloop van de behandeling je kan worden uitgelegd.

### **Niet-spierinvasieve blaaskanker**

De uroloog heeft bij jou blaaspoliepen vastgesteld. Deze blaaspoliepen of niet-spierinvasieve blaascarcinomen zijn woekeringen van het slijmvlies van de blaas en werden door middel van een operatie langs de plasbuis in hun geheel verwijderd. Afhankelijk van het soort poliep, de grootte en het aantal poliepen bij wegname is er een verhoogd risico op een terugkeer ervan.



Het is daarom belangrijk om een nabehandeling te geven om de kans op het terugkomen van de poliepen te verkleinen en eventuele achtergebleven tumorcellen te vernietigen.

Via een blaasinstillatie zal men medicatie in je blaas brengen die de vorming van nieuwe poliepen zal tegengaan. De medicatie die men bij je zal gebruiken, is Farmorubicine®.

### **Wat is Farmorubicine®?**

Farmorubicine® behoort tot de groep cytostatica (chemotherapie), dit is een celdodende en celdeling remmende medicatie. Farmorubicine® doodt de tumorcellen en remt de groei van de tumorcellen af. Aangezien de tumorcellen sneller delen, werkt dit meer op de tumorcellen en minder op de gezonde blaascellen.

## Het verloop

Wanneer je na de ingreep terug op je kamer bent, zal de verantwoordelijke verpleegkundige je parameters controleren. Vervolgens zal de blaasspoeling worden stopgezet en zal men de afloop naar de urinezak afklemmen. We vragen je ook om tijdens de procedure niet te drinken.

De medicatie wordt via de blaaskatheter in de blaas gebracht. De medicatie blijft gedurende één uur in de blaas aanwezig. Men zal je vragen om elk kwartier van lichaamshouding (linkerzijde, rechterzijde en de rug) te wisselen met als doel de medicatie met alle delen van de blaaswand in contact te laten komen. Mocht dit onaangenaam zijn door de aanwezige blaassonde, mag je ook rustig op de rug blijven liggen.

Indien je hevige pijn in de onderbuik ervaart, dien je onmiddellijk de verpleegkundige te verwittigen en wordt de blaasinstillatie vroegtijdig gestopt.

Na één uur zal men de klem van de urinezak nemen, de blaasinhoud laten aflopen en de blaasspoeling weer opstarten.

Na de toediening van Farmorubicine® is de urine roodachtig gekleurd (de medicatie is rood van kleur). Daar hoef je je geen zorgen over te maken.

Het is belangrijk dat je de dagen na de instillatie voldoende drinkt. Na de blaasinstillatie mag je alles eten en drinken.

## Mogelijke bijwerkingen

De klachten die hieronder vermeld worden zijn normaal maar mogen niet langer dan 48 uur duren. Indien dit wel het geval is, word je geadviseerd contact op te nemen met de behandelende uroloog of huisarts.

- Lichte koorts
- Plasklachten zoals vaker of moeilijker plassen, pijnlijk of branderig plassen
- Bloed in de urine
- Huiduitslag
- Roodgekleurde urine
- Allergische reactie, wat zich uit door jeuk aan handen en voeten of aan de geslachtsdelen, al dan niet gepaard met afschilfering van de huid. Deze klachten zijn eerder vervelend maar vrij onschuldig.

## Aandachtspunten voor thuis

Na de behandeling bevat je urine restanten van deze medicatie. Het is daarom belangrijk om volgende maatregelen op te volgen om jou, jouw familie, bezoekers, medepatiënten en hulpverleners te beschermen.

Let op: volg deze maatregelen vanaf de start van de behandeling tot zeven dagen na de laatste toediening tenzij anders vermeld.

Met bevuild materiaal wordt bedoeld, materiaal waar restanten van urine op te vinden zijn.

### Algemeen

- Vermijd steeds rechtstreeks contact met de medicatie en urine.
- Draag steeds wegwerphandschoenen bij het hanteren van bevuild materiaal.
- Verzamel alle gebruikte materialen in een plastic zak en sluit deze goed af. Deze mag meegegeven worden met het huisvuil.
- Was na ieder contact met urine de handen met water en zeep.
- Indien je of iemand van je omgeving toch contact heeft gehad met je uitscheidingsproducten: geen paniek! Was je handen met gewone zeep.
- Het is geen probleem om je naasten aan te raken tijdens de behandeling. Je bent niet besmettelijk. Lichamelijk contact moet niet vermeden worden, knuffelen en zoenen mag.

## Toiletgebruik

- Ga altijd zittend plassen, om spatten te voorkomen.
- Spoel het toilet tweemaal na elkaar door met gesloten deksel.
- Was je handen na ieder toiletbezoek met water en zeep.
- Gebruik een apart toilet indien mogelijk.
- Reinig het toilet dagelijks met een algemene toiletreiniger.
- Bij gebruik van een urinaal of bedpan: ledig deze onmiddellijk na gebruik in het toilet, spoel tweemaal na elkaar door met gesloten deksel en na ieder gebruik steeds uitspoelen met water en zeep.
- Bij risico op incontinentie: gebruik steeds voldoende incontinentiemateriaal, vouw vuil incontinentiemateriaal goed dicht en verzamel in een plastic zak.

## Wasvoorschriften voor bevulde kledij en linnen

- Probeer bevuild wasgoed onmiddellijk te wassen.
- Gebruik steeds wegwerphandschoenen bij het contact van bevuild linnen.
- Was het bevulde linnen afzonderlijk.
- Was eerst op een koud programma en volg nadien de aanbevolen was instructies.
- Indien het niet mogelijk is om het bevulde wasgoed onmiddellijk te wassen, bewaar deze dan in een goed afgesloten dubbele plastic zak.



Let op: de wasvoorschriften gedurende 7 dagen na de behandeling blijven toepassen!

### Seksueel contact

Om je partner te beschermen is het aangeraden om een condoom te gebruiken tot minimum 1 week na de instillatie.

### Wanneer uw arts contacteren:

- Tekenen van infectie (koorts boven  $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$  en/of koude rillingen) , algemeen niet goed voelen
- Plotse huiduitslag
- Bloed in de urine twee dagen na de instillatie
- Kortademigheid
- Bijwerkingen die optreden 48 uur of later na de blaasinstillatie
- Wanneer je je zorgen maakt om een of ander symptoom

## Tot slot

Als je na het lezen van deze brochure nog vragen hebt, kan je contact opnemen met je behandelende arts of met de verpleegkundige van de afdeling.

- Dr. S. Huybrechts, Dr. M. Waterlooos 09/387.71.11
- De oncologisch verpleegkundige 09/387.73.92
- Het onco-team 09/387.73.95
- Het dagziekenhuis 09/387.74.50
- De hospitalisatie afdeling 09/387.73.50





AZ Sint-  
Vincentius  
DEINZE