

» Algemene informatie rond
vaccinatie vind je terug op
LAATJEVACCINEREN.BE



» Ben je ziek of verkouden?
Stel je vaccinatie uit!



MEER INFO?

Het is mogelijk dat je na het lezen van deze folder nog vragen hebt. Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze artsen of IMID-verpleegkundige:

- dr. Castro | dr. Depicker |
dr. Lambrecht | dr. Van Praet
reumato@mijnziekenhuis.be
09 246 70 00
- Kim Huysentruyt
imidverpleegkundige@mijnziekenhuis.be
09 246 71 60

AZ Maria Middelaes heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. Deze folder is indicatief en vervangt een raadpleging bij je arts niet. Mocht deze brochure vergissingen of onvolledigheden bevatten, dan zijn AZ Maria Middelaes, zijn medewerkers en zijn artsen hiervoor niet aansprakelijk.



Buitenring Sint-Denijs 30 | 9000 Gent
09 246 46 46 | info@azmmsj.be
mariamiddelares.be | virtueelziekenhuis.be | jouwjob.be

Volg ons ook op:

COVID-19 vaccinatie

bij patiënten met een reumatische aandoening



PATIËNTENINFORMATIE



GezondheidsZorg met een Ziel

BESTE PATIËNT,

Misschien roept een COVID-19 vaccinatie bij jou bezorgdheden op in verband met je reumatische aandoening. In deze folder willen we alvast enkele antwoorden op veelgestelde vragen meegeven.



Moet ik gevaccineerd worden tegen COVID-19?

Het is aangeraden om je te laten vaccineren tegen COVID-19, tenzij je een allergie hebt voor één van de bestanddelen in het vaccin. Je reumatische aandoening noch je medicatiegebruik zijn redenen om je niet te laten inenten. Ook mensen die reeds COVID-19 hebben doorgemaakt, hebben baat bij een vaccinatie omdat de immuniteit na het doormaken van de ziekte vermoedelijk slechts tijdelijk is.

Is COVID-19 vaccinatie veilig voor mij?

Er is tot op heden geen aanwijzing dat COVID-19 vaccins niet veilig zijn voor mensen met reumatische aandoeningen. De huidige vaccins bevatten een genetische codering voor een deeltje van het virus, maar bevatten niet het virus zelf. Er is dus geen bezorgdheid hierover. Net zoals bij griep- of andere vaccins verwachten we niet dat COVID-19 vaccinatie een opflakking van het onderliggend reuma tot gevolg zou kunnen hebben.

De bijwerkingen die kunnen optreden na vaccinatie zijn doorgaans mild: pijn op de vaccinatieplaats, lichte hoofdpijn, spierpijn.

Laat bij aanhoudende koorts of ernstig ziek zijn (> 48u na het vaccin) een COVID-test uitvoeren. Bij specifieke COVID-19 symptomen (zoals geurverlies) laat je je best onmiddellijk testen.

Werkt het COVID-19 vaccin even goed bij mij?

Wie een reumatische behandeling volgt, zou mogelijks een verminderde respons op het vaccin kunnen hebben. Het immuunsysteem wordt immers door de reumamedicatie wat getemperd, dus dit zou tot gevolg kunnen hebben dat ook de immunreactie op het vaccin (m.a.w. de opbouw van antistoffen tegen het virus) wat lager is. We gaan er echter vanuit dat de respons op het vaccin nog altijd voldoende groot zal zijn om een goede bescherming teweeg te brengen.

Kan ik de inenting krijgen als ik reumamedicatie neem?

Ja, er is geen bezwaar. Reumamedicatie dient niet onderbroken te worden. De werking van reumamedicatie wordt niet beïnvloed door het vaccin.

De enige uitzondering is rituximab (Mabthera®). Als je dit medicijn gebruikt, neem dan zeker contact op met je reumatoloog.

Hydroxychloroquine (Plaquenil®) en sulfasalazine (Salazopyrine®) zijn géén immunomodulerende medicijnen. Je behoort dus niet tot een risicogroep wanneer je deze medicijnen neemt. Ook wie minder dan 10 mg prednisone (cortisone in de volksmond) per dag neemt, loopt in principe geen hoger risico. Ontstekingsremmende medicatie, de zogenaamde NSAIDs, kunnen gewoon verder ingenomen worden.