

## Emla® crème

1. Controleer of de aangeduide huidzone intact, droog en proper is.
2. Perforeer de afsluiting van de tube door de bovenkant van de dop te gebruiken.
3. Breng de juiste hoeveelheid crème in een hoopje op de aangeduide huidzone(s) aan (zie: Hoeveel?).
4. Wrijf de crème niet in en verspreid ze zo weinig mogelijk.
5. Verwijder het beige middenstuk van de Tegaderm-pleister. Er blijft een omlijsting van papier over.
6. Verwijder de bescherm laag van de plakkende kant van het verband.
7. Breng vervolgens het verband zorgvuldig aan over het hoopje crème.
8. Verwijder de papieren rand en druk de randen aan.

## Hoeveel?

Een tube Emla® crème bevat 5 gram.


Leeftijd	Aanbevolen dosis/locatie	Maximale dosis	Maximaal aantal pleisters
0 - 2 maanden (< 5 kg)	0,5 - 1 gram	1 gram	1
3 - 12 maanden (> 5 kg)	0,5 - 1 gram	2 gram	2
1 - 6 jaar (> 10 kg)	1 - 2 gram	10 gram	10
6 - 12 jaar (> 20 kg)	2 gram	20 gram	20
> 12 jaar	2 - 3 gram	50 gram	

## Emla® patch

1. De patch mag niet doorgesneden of in kleinere stukken verdeeld worden.
2. Druk op de hoeken van de pleister voor een goede hechting aan de huid. Druk niet in het midden van de pleister want hierdoor kan de Emla® crème onder de kleefstof terechtkomen.

Wanneer je kind geen kleefpleisters kan verdragen, of wanneer je Emla® crème over hebt maar geen plakker meer, gebruik dan gewone huishoudfolie om de crème af te dekken. Het belangrijkste is dat de crème van de buitenlucht afgesloten wordt.

# EMLA®



## PATIËNTENINFORMATIE



Buitenring Sint-Denijs 30 | 9000 Gent  
09 246 46 46 | [www.mariamiddelares.be](http://www.mariamiddelares.be) | [info@azmmsj.be](mailto:info@azmmsj.be)

SAP 22159 | Mei 2020

Volg ons ook op:



AZ Maria Middelares heeft deze informatiebrochure met de grootste zorg opgemaakt. Deze brochure is indicatief en vervangt de raadpleging bij je arts niet. Mocht deze brochure vergissingen of onvolledigheden bevatten, dan zijn AZ Maria Middelares, medewerkers en artsen hiervoor niet aansprakelijk.



GezondheidsZorg met een Ziel

## Wat is Emla®?

Emla® staat voor 'Eutectic Mixture Lidocaine and Prilocaine'. Het is een crème die op de huid wordt aangebracht en zorgt voor een plaatselijke verdoving. Dit vermindert de scherpe pijn van de prik, maar het is wel mogelijk dat er druk en aanraking gevoeld wordt.

## Wanneer gebruiken?

De crème kan gebruikt worden voorafgaand aan:

- een bloedafname;
- plaatsen van een infuus;
- een vaccinatie;
- curettage van waterwratjes;
- een lumbale punctie.

## Wanneer niet gebruiken?

Emla® mag niet gebruikt worden:

- op plaatsen waar de huidbarrière beschadigd is, dus niet op een open wonde;
- op plaatsen waar er huiduitslag of een opstoot van eczeem is;
- in of dicht bij de ogen;
- in de neus, het oor of de mond;
- in de anus of op de slijmvliezen van de geslachtsdelen van kinderen jonger dan 12 jaar;
- bij overgevoeligheid voor lidocaine en/of prilocaïne.



## Waar aanbrengen?

### Voor bloedafname

Op de handrug of in de elleboogplooi



### Voor vaccinaties

< 1 jaar: middelste 1/3 van het bovenbeen aan de voorzijde.



> 1 jaar: buitenkant van de bovenarm, 3 vingers onder de schouder.



### Voor hyposensibilisatie

Buitenkant van de bovenarm, 3 vingers onder de schouder.

## Hoe aanbrengen?

Een uur voor de prik mag de crème op de huid worden aangebracht. Indien je kind eczeem heeft, volstaat een inwerktijd van 30 minuten.