Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan een ijzerinfuus bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meest gemelde bijwerking is hoofdpijn. Ook andere symptomen, zoals duizeligheid, misselijkheid, buikpijn, verstopping (constipatie), diarree, uitslag of reacties op de aanprikplaats kunnen optreden.

Neem contact op met je (huis)arts als je te veel last hebt van één van deze bijwerkingen of als je andere bijwerkingen ervaart waar je je zorgen over maakt.

MEER INFO?

Het is mogelijk dat je na het lezen van deze folder nog vragen hebt. Aarzel dan niet om je behandeld arts te contacteren.

AZ Maria Middelares heeft deze informatiebrochure met de grootste zorg opgemaakt. Deze brochure is indicatief en vervangt de raadpleging bij je arts niet. Mocht deze brochure vergissingen of onvolledigheden bevatten, dan zijn AZ Maria Middelares, zijn medewerkers en zijn artsen hiervoor niet aansprakelijk.

MARIA MIDDELARES

Buitenring Sint-Denijs 30 | 9000 Gent
09 246 46 46 | www.mariamiddelares.be | info@azmmsj.be

SAP 23923 | februari 2022

Volg ons ook op:

Behandeling met een ijzerinfuus

PATIËNTENINFORMATIE

MARIA MIDDELARES

GezondheidsZorg met een Ziel

Beste patiënt,

Je arts heeft een behandeling met een ijzerinfuus voorschreven. Lees vooraf zeker deze folder: hij bevat zeer belangrijke en nuttige informatie!

Wat is een ijzerinfuus?

IJzer is essentieel voor ons lichaam. De werkzame stof is ijzer(III)carboxymaltose (een ijzerkoolhydraat-verbinding). Het is de belangrijkste bouwstof van hemoglobine, dat aanwezig is in de rode bloedcellen. Zonder ijzer is zuurstoftransport doorheen ons lichaam niet mogelijk.

We halen ijzer uit onze voeding. IJzertekort kan aanleiding geven tot anemie (bloedarmoede). Een behandeling met een ijzerinfuus dient om de ijzer-voorraden in je lichaam aan te vullen.

Wanneer is een ijzerinfuus nodig?

Een ijzerinfuus is uitsluitend verkrijgbaar op voor-schrift van je arts. Die zal het voorschrijven als:

- orale toediening (via de mond) van ijzer niet effectief genoeg is;
- je geen orale toediening van ijzer verdraagt;
- je zeer snel ijzer nodig hebt om de ijzervoorraad in je lichaam op te bouwen.

Hoe verloopt de behandeling?

VOORBEREIDING

- Om het ijzergehalte in je bloed te controleren, wordt bloed afgenomen. Op basis van het resultaat bepaalt de arts welke dosis je nodig hebt, evenals de frequentie en de duur van de behandeling.

Breng vóór de behandeling je arts op de hoogte over:

- de medicatie die je inneemt of tot voor kort innam;
- zwangerschap (of een vermoeden van);
- de aanwezigheid van een infectie;
- allergieën, voorgeschiedenis van ernstige astma, eczeem of andere atopische allergie, immuun- of inflammatoire aandoening (bv. systemische lupus erythematodes, reumatoïde artritis). Hier is het risico op een allergische reactie hoger.

TOEDIENING

- Het ijzer wordt als bruine vloeistof intraveneus toegediend (via een infuus). Dit duurt ongeveer een half uur.
- De verpleegkundige controleert regelmatig je bloeddruk, hartslag en temperatuur om eventuele reacties op het ijzerinfuus vast te stellen.

Als er een **overgevoeligheidsreactie** optreedt tijdens het toedienen, moet de behandeling onmiddellijk stopgezet worden.

Verwittig daarom de verpleegkundige zo snel mogelijk als je je tijdens de behandeling onwel zou voelen.

Overgevoeligheidsreacties zijn zeer zeldzaam. Allergische klachten die kunnen optreden gaan van huiduitslag en jeuk (netelroos) tot kortademigheid en bloeddrukverlaging bij een ernstige allergische reactie.

- De toediening van een ijzerinfuus moet voorzichtig gebeuren om lekkage van het product (toediening naast de ader) te voorkomen. Lekkage kan leiden tot irritatie van de huid en mogelijk een permanente, bruine verkleuring van de huid op de plaats van de injectie. Daarom is het belangrijk de arm met het infuus zo weinig mogelijk te bewegen gedurende de toediening.
- Als je pijn of een zwelling ervaart op de injectieplaats, verwittig dan zo snel mogelijk de verpleegkundige. Als dit optreedt, moet de toediening onmiddellijk gestopt worden.

NA DE BEHANDELING

- Je (huis)arts zal regelmatig je ijzerwaarden opvolgen, om het effect van de behandeling te meten en ijzerstapeling te voorkomen.