


## Wat je best nog weet ...

- Linezolid kan soms je bloedsamenstelling veranderen en daardoor de bloedstolling beïnvloeden. Als je een heelkundige ingreep moet ondergaan (vb. trekken van een tand), vertel dan altijd aan de behandelend arts of tandarts dat je linezolid inneemt.
- Bewaar linezolid buiten het zicht en bereik van kinderen. Bewaar de tabletten op een droge plaats bij kamertemperatuur.
- Linezolid kan je niet aankopen in je gewone apotheek. Je moet hiervoor naar de apotheek van het ziekenhuis.



## MEER INFO?

Het is mogelijk dat je na het lezen van deze folder of de bijsluiter nog vragen hebt.

Aarzel dan niet om je arts of de verpleegkundigen aan te spreken.

AZ Maria Middelaes heeft deze informatiebrochure met de grootste zorg opgemaakt. Deze brochure is indicatief en vervangt de raadpleging bij je arts niet. Mocht deze brochure vergissingen of onvolledigheden bevatten, dan zijn AZ Maria Middelaes, zijn medewerkers en zijn artsen hiervoor niet aansprakelijk.

## Aandachtspunten bij gebruik van linezolid



## PATIËNTENINFORMATIE



Buitenring Sint-Denijs 30, 9000 Gent  
09 246 46 46 | [info@azmmsj.be](mailto:info@azmmsj.be)  
[www.mariamiddelares.be](http://www.mariamiddelares.be)



Schutterijstraat 34, 9800 Deinze  
09 387 71 11 | [info@azstvdinze.be](mailto:info@azstvdinze.be)  
[www.azstvdinze.be](http://www.azstvdinze.be)

Volg ons ook op: 

SAP 21886 | oktober 2022



## BESTE PATIËNT,

Je arts schreef je linezolid (Zyvoxid®) tabletten voor. Lees zeker deze folder voordat je met linezolid start: hij bevat zeer belangrijke en nuttige informatie! Om volledig te herstellen is het uiterst belangrijk dat je trouw je medicatieschema volgt. Raadpleeg ook de bijsluiter die je bij de linezolid tabletten vindt!

## Neem linezolid in zoals je arts het je voorschreef.

Linezolid is een antibioticum dat opgestart wordt in het ziekenhuis voor de behandeling van een longontsteking en sommige infecties van de huid en onderliggende weefsels. Om die infectie te kunnen bestrijden is het zeer belangrijk dat je linezolid na ontslag uit het ziekenhuis verder inneemt zoals je arts het voorschreef.

➤ **Stop nooit met linezolid op eigen houtje!**  
Zorg ervoor dat je de medicatie volledig inneemt, zoals voorgeschreven door je arts.

## Hoe neem je linezolid in?

De normale dosis bedraagt **1 tablet 2 maal per dag** (om de 12 uur). Ben je vergeten je tablet in te nemen? Neem de vergeten dosis dan zo snel mogelijk in, tenzij het al bijna tijd is voor de volgende.

➤ **Neem nooit een dubbele dosis om de vergeten tablet in te halen.**

Wacht vervolgens 12 uur om een nieuwe tablet in te nemen. Blijf nadien je dosis steeds om de 12 uur innemen.

## Hoelang moet je linezolid innemen?

Een kuur duurt gewoonlijk een tweetal weken. Maar soms schrijft de arts dit antibioticum langer voor. Blijf in ieder geval elke dag je tabletten innemen zolang als je arts dit aanbeveelt. Dat is zeer belangrijk om je infectie te overwinnen.

Zoals elk geneesmiddel kan linezolid bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. **Stop zeker niet met linezolid zonder je arts eerst om raad te vragen** als tijdens je behandeling met linezolid een bijwerking optreedt.

## Mag je linezolid combineren met andere medicatie?

Bepaalde geneesmiddelen en voedingssupplementen kunnen de kans op bijwerkingen verhogen. Vermeld daarom steeds aan je arts welke geneesmiddelen je inneemt, ook de producten die je zonder voorschrift bij je apotheker aankoopt.

➤ **Neem tijdens de behandeling met linezolid nooit een ander geneesmiddel of voedings-supplement** zonder eerst advies te vragen aan je arts of apotheker!



## Welke bijwerkingen verdienen extra aandacht?

### ➤ GEZICHTSSTOORNISSEN

Je kan gezichtsstoornissen ervaren zoals wazig zicht. Mogelijk kan je ook minder goed kleuren onderscheiden. Verwittig onmiddellijk je arts en rij niet met een voertuig. Bij langdurige inname van linezolid moet je mogelijk regelmatig op controle bij de oogarts.

### ➤ GEVOELSSTOORNISSEN

Je kan gevoelsstoornissen zoals tintelingen in je vingers of tenen ondervinden. Bij langdurige inname van linezolid kan eventueel ook vitamine B voorgeschreven worden hiervoor.

### ➤ MAAG- EN DARMKLACHTEN

De meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, diarree of braken. Om de kans hierop te verlagen, neem je de tabletten best in met voedsel. Verwittig je arts bij ernstige diarree met bloed en/of slijm, terugkerende misselijkheid, braken of buikpijn.

### ➤ VERANDERINGEN IN HET BLOED

Om deze bijwerking op te volgen zijn regelmatige bloedafnames aangewezen.

➤ **Raadpleeg onmiddellijk je arts** wanneer je tijdens je behandeling één van deze bijwerkingen vaststelt!