

Geachte heer, mevrouw,

Na het plaatsen van een implantaat is het mogelijk dat je last hebt van enkele ongemakken, zeker als er ook een botopbouw gebeurd is.

In deze folder vind je een overzicht van de meest voorkomende ongemakken.

Heb je nog vragen, aarzel dan niet om onze dienst te contacteren. Onze medewerkers helpen je graag verder.

Dr. K. Borghgraef  
Dr. Y. Opdenakker  
Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie  
AZ Maria Middelaes  
Buitenring Sint-Denijs 30 - 9000 GENT  
☎ 09 246 81 00

### **Openingsuren secretariaat**

Maandag: 08.30 - 12.30 uur  
          13.00 - 17.30 uur  
Dinsdag: 08.30 - 12.30 uur  
          13.00 - 17.00 uur  
Woensdag: 08.30 - 12.30 uur  
          13.00 - 17.30 uur  
Donderdag: 08.30 - 12.30 uur  
          13.00 - 17.00 uur  
Vrijdag: 08.30 - 13.00 uur

*Voor dringende gevallen en geen bereik via het secretariaat kan je best contact opnemen via het algemeen nummer 09 246 46 46 en vragen naar je behandelend arts.*

## Meest voorkomende ongemakken

### Zwelling

Er kan zwelling optreden gedurende 48 uur, meestal de laatste 24 uren meer.

Nadien mag de zwelling niet meer toenemen en moet deze stilaan afnemen. Indien de zwelling toeneemt, gelieve dan contact op te nemen met jouw arts.

Om de zwelling te beperken, is ijsapplicatie aangewezen 48 uur.

Bij een botopbouw zal de zwelling meer uitgesproken zijn dan bij het plaatsen van een implantaat in goed eigen bot.

### Pijn

De pijn kan zeer wisselend zijn na de ingreep. Je zal hiervoor pijnstilling krijgen. Bij de meeste implantaat behandelingen valt dit wel mee en mag je een implantaat na 1 week niet meer voelen zitten. Indien dit wel zo is, is het aangeraden jouw arts te contacteren.

Bij botaugmentatietechnieken kan de pijn 10 à 14 dagen duren.

### Voeding

Je mag eten als de verdoving is uitgewerkt. Zachte en lauwe voeding is aangewezen om zwelling en pijn te beperken. Je mag het implantaat niet belasten tijdens de kritische 'ingroeifase', dit gedurende een 3-tal weken.

### Hechting

De wonde is gehecht met resorbeerbare draad.

De hechtingen zullen spontaan verdwijnen.  
Deze mogen ook na een 10-tal dagen  
verwijderd worden.

### Slapen

Bij botaugmentatietechnieken is het  
aangewezen om halfzittend te slapen om zo  
de zwelling te beperken.

### Sport

Bij het meeste implantaatbehandelingen is  
het aangewezen 1 week niet te sporten.  
Voor botaugmentatietechnieken kan dit tot 2  
weken duren.

### Tanden poetsen

Je mag je tanden poetsen, behalve op de  
plaats van de ingreep gedurende de eerste  
dagen. Na een week mag je de healing cap  
mee poetsen.

### Roken / Alcohol

Roken is slecht voor de implantaten zowel  
in de ingroeifase als op termijn omdat dit de  
doorbloeding van het kaakbot beperkt en op  
de botgenezing werkt.



**PATIËNTENINFO**

Informatie na  
**implantologie**

20126 - januari 2019



Gezondheids**Zorg** met een Ziel

Buitenring Sint-Denijs 30 – 9000 Gent  
Tel.: 09 246 46 46 - Fax: 09 246 96 59  
info@azmmsj.be – www.mariamiddelares.be

Volg ons ook op:



MOND-, KAAK- EN AANGEZICHTCHIRURGIE