

## VERWIJSBRIEF PROCEDURES PIJNKLINIEK

datum: ..... / ..... / .....

Verwijzende arts: .....

etiket

Pijnproblematiek:

- Cervicalgie, cervicobrachialgie links / rechts / bilateraal o.b.v. discuss hernia op niveau / facettair lijden op niveau .....
- Lumbalgie, lumboischialgie links / rechts / bilateraal o.b.v. discuss hernia op niveau ..... / facettair lijden op niveau ..... / spinaal kanaal stenose op niveau .....
- Andere: .....

Resultaten medische Medische Beeldvorming en/of EMG:

.....

.....

Diabetes: ja / nee      Allergieën: geen / lood-contrast / lokaal anestheticum / latex / andere: .....

Anti-coagulatie/bloedverduunners: nee / zo ja, gelieve tabel in te vullen

Medicatie	Gestopt?	Laatste inname/toediening
	Nee / ja	..... / ..... / .....
	Nee / ja	..... / ..... / .....
	Nee / ja	..... / ..... / .....

puncties kunnen uitgevoerd worden indien  $INR \leq 1.4$

controle INR na stoppen orale anti-co uitgevoerd?: nee / ja, controle INR op ..... / ..... / ..... : .....

Uit te voeren technische procedure:

Elke infiltratie kan na een periode van 3 weken herhaald worden met een maximum van 3 infiltraties gespreid over een periode van 6 maanden. Nieuwe terugbetalingscriteria voor TF vanaf 01/11/2016: max 3 infiltraties per jaar met tussenkomst van de mutualiteit! Vanaf een 4° TF binnen de 365 dagen na de eerste TF zijn de kosten volledig ten laste van de patiënt.

Cervicale epidurale infiltratie

TF (Transforaminale Epidurale Infiltratie): gelieve 1 gewenst niveau en 1 zijde aan te duiden

TF wortel L 3	Links / rechts
TF wortel L 4	Links / rechts
TF wortel L 5	Links / rechts
TF wortel S 1	Links / rechts

facetinfiltraties: op niveaus ..... Unilateraal: links / rechts - Bilateraal

Sacro-iliacaal gewricht (SIG) infiltratie: links / rechts

① Afspraken: 09/387.74.57

## PROCEDURE PIJNKLINIEK ANTI-COAGULANTIA

ANTI-COAGULANTIA	STOP	HERSTART	LABO
Asaflow <sup>®</sup> , Aspegic <sup>®</sup> , Aspirine <sup>®</sup> , Cardioaspirine <sup>®</sup> , Sedergine <sup>®</sup> , Dipyridamole <sup>®</sup>	NIET STOPPEN	MAG VERDER INGENOMEN WORDEN TIJDENS DE PROCEDURE	
Plavix <sup>®</sup> , Clopidogrel <sup>®</sup>	7 DAGEN VOOR PROCEDURE	1 DAG NA PROCEDURE	
Ticlid <sup>®</sup> , Ticlodipine <sup>®</sup>	10 DAGEN VOOR PROCEDURE	1 DAG NA PROCEDURE	
Sintrom <sup>®</sup>	3 DAGEN VOOR PROCEDURE	1 DAG NA PROCEDURE	! CONTROLE op INR Resultaat = $\leq 1.4$  <i>OVERSCHAKELING LMWH IN OVERLEG MET HA</i>
5520Marcoumar <sup>®</sup> , Marevan <sup>®</sup>	10 DAGEN VOOR PROCEDURE	1 DAG NA PROCEDURE	! CONTROLE op INR Resultaat = $\leq 1.4$  <i>OVERSCHAKELING LMWH IN OVERLEG MET HA</i>



## PROCEDURE PIJNKLINIEK ANTI-COAGULANTIA

Clexane <sup>®</sup> , Fraxiparine <sup>®</sup> , Fraxodi <sup>®</sup> , Innohep <sup>®</sup>	PROFYLACTISCH = 12 UUR VOOR DE PROCEDURE THERAPEUTISCH = 24 UUR VOOR DE PROCEDURE	TEN VROEGSTE 4 UUR NA DE PROCEDURE	
Arixtra <sup>®</sup>	36 UREN VOOR DE PROCEDURE	12 UUR NA DE PROCEDURE	
Xarelto <sup>®</sup>	48 UREN VOOR PROCEDURE	48 UREN NA PROCEDURE	
Eliquis <sup>®</sup>	48 UREN VOOR PROCEDURE	5 UUR NA PROCEDURE	
Pradaxa <sup>®</sup>	CREATININE KLARING <u>&gt; 80 ml/min</u> : 2 dagen voor procedure CREATININE KLARING <u>50-80 ml/min</u> : 3 dagen voor procedure CREATININE KLARING <u>30-50 ml/min</u> : 4 dagen voor procedure	HERSTARTEN WANNEER VOLLEDIGE HEMOSTASE BEREIKT IS Max. anti-coagulerend effect: 2u na inname = 1 dag na procedure	
Brilique <sup>®</sup>	7 DAGEN VOOR PROCEDURE	1 DAG NA PROCEDURE	
Lixiana <sup>®</sup>	48 UREN VOOR PROCEDURE	12 UREN NA PROCEDURE	

