

## Wat is zoledroninezuur (Aclasta)?

Aclasta wordt gebruikt voor de behandeling van osteoporose (een ziekte die de botten broos maakt waardoor de kans op botbreuken toeneemt).

Deze behandeling wordt aangeboden aan patiënten met osteoporose en/of met een botbreuk (heup, wervel, pols,...) Doel van de behandeling is de kans op botbreuken te verminderen.

## Hoe werkt zoledroninezuur?

Osteoporose ontstaat door de natuurlijke botafbraak. Geleidelijk aan worden botten dunner en brozer, waardoor ze gemakkelijker kunnen breken. Zoledroninezuur de werkzame stof van Aclasta is een bisfonaat. Deze stof stopt de werking van de osteoclasten, de cellen in het lichaam die een rol spelen bij afbraak van het botweefsel. Het geneesmiddel wordt eenmaal per jaar toegediend. Dit geneesmiddel wordt in combinatie gebruikt met voldoende calcium en vitamine-D supplementen.

## Duur van de behandeling

Bij aankomst op het dagziekenhuis voor de geriatrische patiënt wordt u ontvangen en bevraagd door de verpleegkundige. Uw bloeddruk en hartslag worden bepaald. Vervolgens zal er een bloedafname plaatsvinden om de werking van de nier na te gaan.

Indien deze labowaarden goed worden bevonden door de arts, mag het geneesmiddel toegediend worden. De tijdsduur van de infuustoediening bedraagt maximum 30 minuten.

Het verblijf in het ziekenhuis zal met bloedafname ongeveer 3 à 4 uur in beslag nemen.

## Welke risico's houdt het gebruik van Zoledroninezuur (Aclasta) in?

De meeste patiënten ondervinden geen of nauwelijks bijwerkingen van dit geneesmiddel.

Soms kan het zijn dat men te maken krijgt met griepachtige verschijnselen, zoals koorts, vermoeidheid, zwakte, slaperigheid, hoofdpijn, diarree, koude rillingen of bot- en spierpijn. U mag bij deze verschijnselen een dafalgan innemen. Indien deze verschijnselen langer dan een dag aanhouden is het aangewezen om uw huisarts te contacteren.

Ook klachten van een onregelmatige hartslag meldt u het best aan uw arts. Bij aanhoudende klachten van wondjes in uw mond of kaak, kunt u contact opnemen met uw tandarts. Houd alleszins een goede mondhygiëne aan.

Wanneer u op controle gaat bij uw tandarts, gelieve hem te verwittigen dat u behandeling met zoledroninezuur (Aclasta) krijgt.

## Praktisch

Gelieve uw recente medicatielijst mee te brengen en de medicatie die u neemt gedurende die dag.

U hoeft die dag niet nuchter te zijn.

We raden u aan gedurende die dag een paar glazen extra water te drinken. Tijdens uw verblijf krijgt u een maaltijd aangeboden indien nodig.

Gelieve bovenkledij te dragen met loszittende mouwen.

Indien u nog vragen heeft kan u altijd contact opnemen met onze afdeling:

Dagziekenhuis voor de geriatrische patiënt  
D202 - tweede verdieping (Gate D)

Tel.: 09 246 22 01




## Uw afspraak

Op ..... / ..... / ..... om ..... uur

Bij aankomst mag u zich eerst inschrijven aan de infobalie in het atrium.

Bent u toch verhinderd?

Mogen wij u vriendelijk vragen telefonisch contact op te nemen met de verpleegkundige van de afdeling om een nieuwe afspraak te maken.



PATIËNTEN INFO

## Zoledroninezuur tegen botontkalking

1690 - 0.1



GezondheidsZorg met een Ziel

Buitenring Sint-Denijs 30 – 9000 Gent  
Tel.: 09 246 46 46 - Fax: 09 246 96 59  
info@gazmmsj.be – www.mariamiddelares.be

Volg ons ook op:



DAGZIEKENHUIS VOOR DE GERIATRISCHE PATIËNT