

Een verbredingsplastie wordt uitgevoerd wanneer de voorhuid vernauwd geraakt. Hierdoor kan pijn ontstaan bij het naar achter schuiven van de voorhuid of bij het zwellen van de penis.


Vorbereiding

Je meldt je 's morgens samen met je zoon op het afgesproken uur aan de opnamedienst. Vervolgens wordt je begeleid naar de kinderafdeling.

Een van de ouders kan hem vergezellen naar de operatiezaal en bij hem blijven tot de algemene verdoving is toegediend. Nadien wordt ook een lokale verdoving gegeven - caudaal blok of peniel blok- om ervoor te zorgen dat er bij het ontwaken geen pijn wordt gevoeld.

De operatie

Er worden drie insneden gemaakt in het vernauwde stuk. Nadien wordt de huid dwars hierop weer gehecht. Dit gebeurt met verteerbare draadjes.



Na de operatie

Bij het ontwaken kan je normaal opnieuw aanwezig zijn bij je kind. Soms is dit niet mogelijk door specifieke omstandigheden in de ontwaakkamer.

Vrij vlug na de ingreep kan hij terugkeren naar de kinderafdeling.

Enkele uren later komt de uroloog langs en zal je zontje de afdeling kunnen verlaten.

Nazorg

Voor het behandelen van pijn na de ingreep kan je eerst paracetamol toedienen. Indien dit onvoldoende is kan je overschakelen naar een ontstekingsremmers (ibuprofen) Een voorschrift hiervoor wordt je meegegeven.

Twee keer per dag de voorhuid zo ver mogelijk reduceren en lokaal Terracortrilsuspensie aanbrengen. Deze zalf wordt je normaal meegegeven in het ziekenhuis.

De aanwezige draadjes verdwijnen normaal spontaan na tien tot twintig dagen.

Je zoon mag douchen, maar voor het nemen van een bad wacht hij best enkele dagen.

Verwikkelingen

- Bloeding: Zeldzaam kunnen de spontane nachtelijke erecties verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van een nabloeding. Een vroegtijdige controle bij je uroloog kan dan noodzakelijk zijn.
- Ontsteking: Het toenemen van pijn of lokale roodheid kan een gevolg zijn van een ontsteking en ook in dit geval moet je vroegtijdig contact nemen met je uroloog.

Tot slot

Als je na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kan je contact opnemen met je behandelende arts of met de verpleegkundige van de afdeling.



Verbreidingsplastie of fimosoplastie bij het kind

